

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと
必要時に読めるように大切に保管すること

第2類医薬品

筋肉痛・関節痛に インドメタシン配合

フジメタシン[®]1.0%液

経皮浸透型 鎮痛・消炎薬

〔フジメタシン1.0%液の特徴〕

1. 経皮浸透したインドメタシンが、痛みの原因物質（プロスタグランジン等）の生成を抑え、筋肉痛、関節痛、肘の痛み等にすぐれた効果を発揮します
2. *l*-メントールを配合していますので、痛みをやわらげ、さわやかな清涼感があります
3. 肌にべとつかず、患部にむらなく塗布することができる液剤です



〔使用上の注意〕



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる）

1. 次の人は使用しないでください
 - （1）本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人
 - （2）ぜんそくを起こしたことがある人
2. 次の部位には使用しないでください
 - （1）目の周囲、粘膜等
 - （2）しっしん、かぶれ、傷口
 - （3）みずむし・たむし等または化膿している患部
3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師または薬剤師にご相談ください
 - （1）医師の治療を受けている人
 - （2）妊婦または妊娠していると思われる人
 - （3）本人または家族がアレルギー体質の人
 - （4）薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師にご相談ください
 - （1）使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、ヒリヒリ感、熱感、乾燥感

- （2）5～6日間使用しても症状がよくならない場合

【効能】

筋肉痛、関節痛、腰痛、腱鞘炎（手・手首の痛み）、肘の痛み（テニス肘等）、打撲、捻挫、肩こりに伴う肩の痛み

【使用法】

年 齢	1日使用回数
11歳以上	4回を限度として、適量を患部に塗布してください
11歳未満	使用しないこと

- (1) 11歳以上の小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください
- (2) 目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください
- (3) 外用にのみ使用してください
- (4) 塗布部位をラップフィルム等の通気性の悪いもので覆わないでください
- (5) 1週間あたり50mLを超えて使用しないでください
- (6) 容器の使い方

1. 図のように容器を逆さに持って、スポンジ面を数回患部に押しつけ、薬液をスポンジに十分に浸透させて塗布してください
薬液がスポンジ面に充分浸透していないと、スポンジ面が破れるおそれがありますので、ご注意ください



2. 使用後はスポンジの乾燥を防ぐため、必ずキャップをしっかりと閉めてください



【成分・分量】

本剤は液剤で、100g中に次の成分を含有する

インドメタシン 1g
l-メントール 3g

添加物：ベンジルアルコール、ポリソルベート80、チオ硫酸ナトリウム水和物、イソプロパノール、ゲラニオール、エタノール

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください
- (3) 他の容器に入れ替えないでください（誤用の原因になったり、品質が変わる）
- (4) 火気に近づけないでください
- (5) 本剤は化学繊維、プラスチック類、塗装面等を溶かししたりすることがありますので、床、家具、メガネ等につかないようにしてください
- (6) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないでください

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します
第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
〒103-8234 東京都中央区日本橋 3-14-10
電 話 03(5205)8331
受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

® 登録商標



販売元
第一三共ヘルスケア株式会社
東京都中央区日本橋3-14-10

製造販売元
ホシエヌ製薬株式会社
奈良県五條市住川町1380番地