

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

## のどの殺菌・消毒、口臭除去に



## 口腔内殺菌消毒薬

イソジン<sup>®</sup>うがい薬

イソジンうがい薬は、ポビドンヨードを有効成分とするうがい薬です。

©/atto

- 有効成分ポビドンヨードが、ヨウ素を遊離し、各種の細菌、真菌、ウイルスなど広範囲の微生物に対して迅速な殺菌・消毒効果を発揮します。
- イソジンうがい薬は、有効成分ポビドンヨードの殺菌・消毒効果と、うがいによる洗浄効果により、口腔内及びのどの殺菌・消毒、口臭の除去にすぐれた効果を示します。



## 使用上の注意



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)  
次の人は使用しないでください。

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



## 相談すること

①次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。

□内のひどいだれ

- (3) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害

②使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

③5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■用法・用量 1回、本剤2～4mLを水約60mLにうすめて、1日数回うがいしてください。


<用法・用量に関する注意>

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 本剤はうがい用だけに使用し、キズややけどへの使用や、内服はしないでください。
- (3) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4) 本剤は使用する時にうすめて、早めに使用してください。
- (5) 定められた用法、用量を厳守してください。


**イソジンうがい薬はこのようにご使用ください。**

うがいは1日数回行ってください。1回分のうがい液は、次のようにうすめてつくってください。


**うすめ方**



1～2目盛りを入れます。



1) キャップを開けて、うがい薬がはねないように注ぎ口をお持ちのコップに入れます。2) ボトルを逆さまにまっすぐに目盛りを見ながら、ボトルの側面をゆっくり押し、1～2目盛りのうがい薬をコップに入れてください。(1目盛りで約2mLの薬剤がでます。)



コップ1/3が約60mLの目安です。

うがい薬を入れたコップに、約60mLになるように水を入れてうすめてください。一般的のコップでは、1/3くらいが約60mLの目安です。

■成分・分量 1mL中 ポピドンヨード70mg(有効ヨウ素として7mg)

●添加物として、エタノール、l-メントール、サッカリンNa、香料を含有します。

<成分・分量に関する注意>

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

■効能・効果 口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 衣服等に付着すると着色しますので注意してください。なお、付着した場合にはすぐに水でよく洗い落してください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

■包装 30mL、50mL、120mL、180mL、250mL、500mL

<製品情報問い合わせ先>

Meiji Seika ファルマ株式会社 <すり相談室:電話(03)3273-3474

受付時間:9時から17時まで(土、日、祝日を除く)

<副作用被害救済制度の問い合わせ先>

(独)医薬品医療機器総合機構 電話0120-149-931(フリーダイヤル)

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

発売元

株式会社 明治

136-8908 東京都江東区新砂1-2-10

製造販売元

Meiji Seika ファルマ株式会社

東京都中央区京橋2-4-16

M1ADGJS

技術提携:ムンディファーマ B.V.