

第2類医薬品

胃腸薬 **キャベジン** コーワ錠

私たちの食生活は年々よくなってきており、平均寿命も延びています。ところが、その反面、おいしいものが何でも食べられるために、食べ過ぎたり、お酒を飲みすぎたりして、胃や腸などの消化器系諸臓器に負担がかかり、年齢と共に弱ってくるこれら諸臓器の寿命に悪い影響を与えているケースが増えてきているのです。キャベジンコーワ錠は、このような胃や腸などの諸臓器を元気に修復し、正常に整えるためのお薬で、粘膜のすぐれた修復成分であるMMSC（メチルメチオニンスルホニウムクロリド）を1日量として150mg配合してあります。

おのみになっていますと、弱ってきた胃や腸などの諸臓器は、次第に正常な状態に整えられてまいります。

△ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

1. 次の人は服用しないでください
透析療法を受けている人。
2. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
胃腸鎮痛鎮痙薬
3. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
（母乳に移行して乳児の脈が速くなることがあります。）
4. 長期連用しないでください

🗨️ 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 高齢者。
(4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5) 次の症状のある人。 排尿困難
(6) 次の診断を受けた人。 腎臓病、心臓病、緑内障
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

その他の注意

母乳が出にくくなる場合があります。