

効能・効果

胃酸過多、胸やけ、げっぷ、胃痛、胃重、胃部不快感、飲みすぎ、食べ過ぎ、嘔吐、胸つかえ、消化不良、消化促進、胃部・腹部膨満感、食欲不振、もたれ、胃弱、はきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心）

用法・用量

下記の量を毎食後水又は温湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2錠	3回
8歳以上15歳未満	1錠	
8歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分・分量（6錠中）

●メチルメチオニンスルホニウムクロリド 150.0mg ●合成ヒドロタルサイト 360.0mg ●炭酸水素ナトリウム 1500.0mg ●メタケイ酸アルミン酸マグネシウム 540.0mg ●ロートエクス3倍散 90.0mg（ロートエクスとして30.0mg）●ホップ乾燥エキス 30.0mg（ホップとして428.6mg）●センブリ末 28.0mg ●ビオダアスターゼ2000 30.0mg

〔添加物〕カルメロースCa、ステアリン酸Mg、ヒドロキシプロピルセルロース、硬化油、ステアリン酸ポリオキシシル、ステアリン酸グリセリン、セラック、タルク、セルロース、ポリビニルアルコール（部分けん化物）、ケイヒ、L-メントール、トウモロコシデンプン、デキストリン

<成分・分量に関連する注意>

メチルメチオニンスルホニウムクロリドなどが配合されていますので、特有のニオイがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- (4)水分が錠剤につくと、特有のニオイが強くなったり内容成分の変化のものととなりますので、水滴をおとしたり、ぬれた手で触れないでください。誤って錠剤をぬらした場合は、ぬれた錠剤を廃棄してください。
- (5)ビンの中の詰め物は、輸送中に錠剤が破損するのを防止するのために入れてあるもので、キャップをあけた後は、必ず捨ててください。
- (6)ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などにより、品質に影響を与える場合がありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- (7)使用期限（外箱及びラベルに記載）をすぎた製品は服用しないでください。



本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は
興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。
〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14
TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566
電話受付時間：月～金（祝日を除く）9:00～17:00



Kowa 製造販売元 興 和 株 式 会 社 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

Y1234 A3F 37190