

この外箱は本剤とともに保管し、使用に際しては必ずお読みください。

虫さされ・かゆみに

鎮痒消炎薬

マキロンかゆみどめパッチ 第3類医薬品

⚠(使用上の注意)

❌してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)
次の部位には使用しないでください

傷口、湿潤(掻き壊し)、ただれ、かぶれ。

■相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。(3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この外箱を持って医師又は薬剤師に相談してください

(1) 使用后、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
患部	かぶれ、色素沈着

(2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

〈お問い合わせ先〉

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室
電 話 03 (6667) 3232
受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電 話 0120-149-931(フリーダイヤル)

販売元 **第一三共ヘルスケア株式会社**
東京都中央区日本橋小網町1-8

製造 **救急薬品工業株式会社**
販売元 富山県射水市戸破32-7

【効能・効果】虫さされ、かゆみ、しもやけ

【用法・用量】パッチを台紙からはがし、1日数回患部に貼ってください。
《用法・用量に関連する注意》

(1) 定められた用法・用量を遵守してください。(2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。貼付部位にかぶれや色素沈着などを起こすことがあります。(3) 外用にのみ使用してください。(4) 汗をかいたり、皮膚がぬれているときは、よくふき取ってから使用してください。(5) 同じ場所に長時間の使用はさけてください。

【成分・分量】本品の膏体100g(1.25m²)中

成 分	分 量	はたらき
ジフェニドラミン	1.0g	かゆみを抑えます。(抗ヒスタミン剤)
グリチルレチン酸	0.5g	炎症を抑えます。(消炎剤)
クロタミトン	5.0g	かゆみを抑えます。(鎮痒剤)
イソプロピルメチルフェノール	1.0g	殺菌作用があります。(殺菌剤)

(添加物:メタクリル酸・アクリル酸ブチルコポリマー、BHT、トメントール)

【保管及び取扱い上の注意】

(1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。(2) 小児の手の届かない所に保管してください。(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)(4) 保管の際にはアルミ袋の切り口を折り曲げて保管してください。(5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】23パッチ(直径2.0cm×21パッチ、直径2.5cm×2パッチ)

Ⓔ登録商標