

使用前にこの説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要な時に読めるように大切に保管して下さい。

第3類医薬品

のどの痛み のどのあれに

プレコール®のどスプレー

口腔咽喉薬

〔プレコールのどスプレーの特徴〕

1. 有効成分ポビドンヨードがのどのあれ、痛み、声がれにすぐれた効果を発揮します。
2. チェリーの香りで、のどをスッキリさわやかにします。
3. 携帯に便利なオーバーキャップ式の容器です。



〔使用上の注意〕



してはいけないこと

(守らないと現状の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないで下さい

本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないで下さい



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (2) 授乳中の人。
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (5) 次の症状のある人。

口内のひどいただれ

- (6) 次の診断を受けた人。

甲状腺機能障害

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師又は薬剤師に相談して下さい

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
皮 膚	発疹・発赤
消 化 器	悪心、吐気
そ の 他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	使用後すぐにじんましん、浮腫、胸苦しさ等とともに、顔色が青白くなり、手足が冷たくなり、冷や汗、息苦しき等があらわれる

- (2) 5～6日間使用しても症状がよくならない場合

〔効能・効果〕

のどの炎症によるのどのあれ・のどの痛み・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

〔使用法〕

1日数回、適量をのどの粘膜面に噴射塗布して下さい。

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用して下さい。
- (2) のどの粘膜面におのみ使用して下さい。
- (3) 目に入らないように注意して下さい。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けて下さい。

〈使用方法〉

- 息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入るおそれがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、ア〜ッと声を出しながら、2〜3回患部に噴射して下さい。



- 最初は液が出るまで4〜5回押して下さい。
- 使用後は清潔なティシュペーパー等で拭いてキャップを閉めて下さい。

〔成分・分量〕

本剤は、赤褐色の液剤で、1mL中に次の成分を含有する。

ポビドンヨード……………4.5mg

添加物：ヨウ化K、グリセリン、l-メントール、エタノール、香料、プロピレングリコール

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所にキャップをして保管して下さい。
- (2) 小児の手の届かない所に保管して下さい。
- (3) 他の容器に入れ替えないで下さい。(誤用の原因になったり、品質が変わります。)
- (4) 衣服に付着した時は、水で洗い流して下さい。
- (5) 火気に近づけないで下さい。
- (6) 外箱に表示の使用期限を過ぎた製品は使用しないで下さい。

本品についてのお問い合わせは、下記にお願い致します。

第一三共ヘルスケア株式会社 お客様相談室

〒103-8234 東京都中央区日本橋3-14-10

電話 03(5205)8331

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

®登録商標



製造販売元

第一三共ヘルスケア株式会社

Daiichi-Sankyo

東京都中央区日本橋3-14-10