

鎮痛消炎プラスター剤 パスタйм®A

第3類医薬品

パスタйм A は肩こり、腰痛、筋肉痛等にすぐれた鎮痛消炎効果のある、ニオイをおさえた微香性プラスター剤です。

【使用上の注意】

❌ してはいけないこと

〔守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります〕

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 目の周囲、粘膜等 (2) 湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ

3. 5～6 日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、打撲、捻挫、関節痛、骨折痛、しもやけ

【用法・用量】 1 日数回患部に貼付してください。

用法・用量に関連する注意

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2) はった患部をコタツや電気毛布などで温めないでください。
(3) 強い刺激を感じるがあるので、入浴の 30 分以上前にはがしてください。
また、入浴後にはる場合は 30 分位してからはってください。
(4) 汗などをよくふき取り、患部をきれいにしてから使用してください。
(5) 皮膚の弱い人は、同じところに続けてはらないでください。

【成分・分量】 膏体 100g 中

サリチル酸グリコール	4.3g
l-メントール	6.1g
トコフェロール酢酸エステル（ビタミン E）	4.3g
ノニル酸ワニルアミド	0.012g

添加物として BHT、生ゴム、水素添加ロジングリセリンエステル、スチレン・イソプレン・スチレンブロック共重合体、ポリブテン、その他 2 成分を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

1. 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
2. 小児の手のとどかない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります）
4. 開封後は袋の口を折りまげて保管し、早めに使用してください。
5. 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

【包 装】 5.5cm×7.2cm 20 枚（10 枚/袋×2 袋）、40 枚（10 枚/袋×4 袋）、60 枚（10 枚/袋×6 袋）

製造販売元

祐徳薬品工業株式会社

佐賀県鹿島市大字納富分 2596 番地 1

【お客様相談窓口】 TEL.0954-63-1320

受付時間 9:00～17:00（土、日、祝日は除く）

副作用被害救済制度の問合せ先

(独)医薬品医療機器総合機構

<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>

☎ 0120-149-931